

10 Août 1781

Opération Du Javart

n° 42

Chirurgie Vétérinaire

Le Javart ancré est le seul qui exige
une véritable Opération. Le Javart tendu
& profond demande quelque soit une simple
Incision faite au Legumeis à l'effet de dé
& de frayer au Pus une route au-dehors: mais
Javart Simple n'a besoin que de la Nature & de
quelques légers Secours de l'Art, pour
sortir sainement.



Toutes les parties du Pied sont également sujettes
au Javart dont nous prétendons purger l'Art, mais
les Impressions quo' elles ne font pas toutes également
dangereuses. leur Situation, leur Nature, leur
consistance & leur mollesse en rendant les effets différents
celui dont le siège sera dans l'épaisseur de la
Fourchette molle, ou dans le corps gras spongieux
logé sous cette même Fourchette & entre les talons
est plus à craindre que celui qui n'occupe que la
Superficie du Nœud formant le Bourlet qui
entoure la Couronne. quand Il attaque les Fémur de
la Paroi antérieure que ceux de bas du Pied Il est très-

ARC 38

n° 87 (ca)

rarement sans le stop attaqués. on se contente
dans les autres cas de découvrir le Mal; mais
dans celui-ci Il faut nécessairement aller
au-delà: les Cartilages dont Il s'agit, une fois
Intéressés, S'exfolient difficilement. Nous trouvons
toujours des Carrièr. de foliations, si on peut
ainsi parler, qui forment dans le temps même où
l'Ulce est en quelque sorte regardé comme
guéri, des fistules qui obligent à de nouvelles
Opérations presque toujours aussi infructueuses
que la première: la Maladie se complique; la
forme du Pied se dévoie, & le Mal est bientôt
au-dessus des forces de la Nature & du Pouvoir de
l'Art. On prévient ces Nécessités & ces Occidans
en extirpant en entier & dans le même temps le
Cartilage affecté. mais cette Opération, qui aigi,
ainsi que nous l'avons observé, beaucoup de Lanière
& de Détériorité de la part de l'Artiste, est un
moyen très - sûr & très - prompt pour mettre fin
à cette Maladie. c'est un Fait dont une
expérience journalière nous garantit la fertilité.
Il a été connu aux Maréchaux parcequ'J'ai vu
la hardiesse ni la témérité ne peuvent en supplanter



ARC 38

n° 87 (62)

douleurs, mais moins dangereux que si l'aorte atteinte
atteinte à l'un des Cartilages latéraux. lorsque le
Puso ~~partie~~ atteinte détruit le Ligament &
Capsulaire de l'articulation, qui s'est pénétré
entre les Osselets, qui s'est séparé de les Cartilages
lisses & polis qui dépendent les Surfaces des
os articulées, le Mal est incurable, & le
Animal est irrévocablement perdu.
au surplus la Benignité ou la Malignité
de cette Maladie est encore augmentée par
l'état actuel des humeurs qui circulent, par le
plus ou moins d'ancienneté du Mal; par le
traitement qui peuvent avoir employé les
Médicaments & enfin par les Causes qui l'auront
occasionné.

Quelques soient les Parties du Pied qu'on
s'avant occupe, on ne peut se dispenser
d'opérer, parcequ'il s'agit toujours d'en
découvrir le foyer, de faciliter l'écoulement de la
Matière Suppurée, d'extraire & solliciter
la chute des parties solides qui en font le
siège & qui doivent se résorber. la plus laborieuse
la plus difficile & la plus dangereuse des
Opérations à pratiquer est celle qui doit se faire
sur l'un des Cartilages latéraux, car ils sont
— rarement

rarement tout les Jours attaqués. on se contente
dans les autres cas de découvrir le Mal; mais
dans celui-ci il faut nécessairement aller
au-delà: les Cartilages dont il s'agit, une fois
intéressés, S'exfolient difficilement. Nous trouvons
toujours des Carrièr. exfoliations, si on peut
ainsi parler, qui forment dans le temps même où
l'Ulce est en quelque sorte regardé comme
guéri; Des fistules qui obligent à de nouvelles
Opérations presque toujours aussi infructueuses
que la première: la Maladie se complique; la
forme du Pied se dévoie, & le Mal est bientôt
au-dessus des forces de la Nature & du Pouvoir de
l'Art. On prévient ces Nécessités & ces Occidans
en extirpant en entier & dans le même temps le
Cartilage affecté. mais cette Opération, qui a été
ainsi que nous l'avons observé, beaucoup de Lumière
& de Dextérité de la part de l'Artiste, est un
moyen très - sûr & très - prompt pour mettre fin
à cette Maladie. c'est un Fait dont une
expérience journalière nous garantit la vérité.
Il a été reconnu aux Maréchaux parce qu'ils ont
la hardiesse ni la témérité ne peuvent en supposer



ARC 38

n° 87 (62)

& leur rendre Savoir; & que du reste Il faut
une forte de fond pour mettre à profit les
leçons de l'expérience.

Nous ajouterons que ces mêmes Cartilages
peuvent être offensés par d'autres causes que
par des Javarts. le Pas que fournit un Crapau,
une Seyne, Des Bleyeres & d'autres Vices
qui affectent l'intérieur du Pied - peut les
atteindre & les corroder; & alors le Mal est
d'autant plus redoutable qu'il équivaut à un
ou deux Javarts - encores dont Il ne sera possible
de triompher que par l'entèvement & l'Extirpation
de ces parties lésées. nous avons enco été obligés
de venir là après des Sections accidentelles
faites à ces parties en opérant dans les talons.

Avant de procéder à l'Opération du
Javart encorné Il est des attentions à avoir.
les Unes regardent le Malade en-général & les
autres regardent la partie lésée en-particulier.

Mettre l'animal au Régime. Saigner; Donner
des Lavemens Emolliens; Donner des Breuvages
Légers & Délayans. Si vous soupçonnez le
Tempérament vicié, purger, Dépurer la Masse
ne perdre pas un Instant. occupez-vous pendant le
— Temps

temps du Régime & de l'administration des Remèdes,
 Préparatoire, & à disposer la partie Malade
 à l'Opération. le Vif ou Spongieux des Calons est-il
 le Siège du Mal? préparez la sole solide à être
 enlevée (voyez l'Opér.^{on} de la Disfolure); mettez
 un fer très-léger & très-dégagé; faites prendre
 un Pediluve matin & soir, & appliquez à la
 sortie du Bain, un Cataplasme émollient gras. Les
 Remèdes seront employés dans tous les Cas; nous
 n'en ferons plus mention. Il en sera de même du
 Poel, que l'on ne doit pas omettre de couper au tour de
 la Couronne & du Paturon. Le foyant Siege-t-il
 sur le Nez au de la Couronne? parez le pied très-
 à fond & appliquez un fer très-mince. est-il situé
 entre l'OS & la Parois? parez comme dans le Cas
 précédent, remettez la Parois comme dans l'Opération
 de la Scyme (voyez-en le Manuel), & mettez un
 fer ébancré dans le lieu répondant à la partie
 Malade. Est-il question en fin de la Lésion d'un des
 Cartilages Latéraux, abattez la Parois & la Sole
 jusqu'à la partie demi-vive; ajustez & fixez un
 fer à-demi-lunette, afin de laisser le quartier
 Malade à-découvert: remettez jusqu'au vif la



ARC 38

N° 87 (C3)

Parois sur le quartier affecté. Depuis le Calot,
Jusqu'à la Mammelle, en suivant la direction du
Bord Supérieur du Foritage qui est engagé dans
l'ongle à un pouce de la Couronne & dans une
direction Parallele à celle de cette même
Couronne: Entailler, encore cette même Parois
avec la ~~Scalpe~~^{Scalpe} dans l'endroit de la Mammelle, &
directement à l'extrémité de la Première de la
première Entaille, mais dans une direction
Verticale, & de manière que cette seconde Entaille
tombe perpendiculairement sur la première &
ne la passe pas, les Lignes devant être rasées
entre celle-ci & la Couronne.

Les Humeurs du Sujet lempirées, adoucies,
Dépurées, la partie Malade suffisamment relâchée,
& les Douleurs apaisées, procédez à l'opération que
le Savant exige. Nous croyons devoir ne faire
mention ici que de celle qui a rapport à
l'enlèvement du Foritage: le Manuel des Ombres
se trouvera suffisamment décrit dans l'extirpation
du Corps Pyramidal de la fourchette, dans
l'enlèvement de la Tumeur, & d'ailleurs comme il
n'est question dans tous ces cas que de donner
Issue à la Matière, de prévenir & de détruire

Les Clapiers qu'elle aurait pu former, la
manière d'agir sera dictée par la circonstance à tout
Artiste instruit de la Structure, de l'usage & de
l'importance des Parties.

Vous ne devez pas omettre le détail des
Instruments & des Choses que l'élève doit avoir
scrupuleusement préparées & rassemblées avant de
procéder à l'Opération qu'il médite. Il gagnera donc
certifiquement un grand Plat d'étain de feuilles de
Sauge, de diverses grandeurs, d'une Gorge, de
Tenailles à droite & à gauche, de bistouri
droit & courbe, de ciseaux droit & courbe sur
plat, d'un Scutellon à Opération, de deux
Scalpels, d'une Pince Anatomique, d'un Bec de
Corbin, d'un tournaquet, d'une suffisante quantité
d'Esprit-de-Vin, de Camphre, d'une Bande
roulée à deux chefs faite d'un Ruban de fil de
4. aunes de longueur sur deux pouces de largeur,
de Plumaceaux gradués, d'Etoupades, & d'une
enveloppe. Il faut aussi des Onguent anodins pour
mettre au-tour du Pied.

Les Choses ainsi préparées, faites fixer
l'Ornement, qui doit être à Jeun dans le Cravain, ou
pour opérer plus sûrement & plus commodément,
à balayer le sur une bonne Litière: que la Chute



Effectuer du côté gauche si vous avez à
opérer l'un des Quartiers de dedans du Bipède du
Montoir, ou l'un des Quartiers de dehors du
Bipède opposé. mais si c'est l'un des autres
quartiers qui soit affuté faites le coucher sur
le côté droit. le Pied Malade appartient-Il
à l'un des extrémités antérieures; fixez-le en
attachant le canon de la Jambe à laquelle Il
répond sur la partie inférieure du tibia,
c'est-à-dire au-dessus du jarret; & si Il
dépend de l'un des Membres composant le Bipède
postérieur, sujettez-le au-dessus du genou
mais de manière que la partie à opérer soit
dégagée & néanmoins très-affaiblie, dans la
crainte qu'elle ne glisse & ne descende près du bout
lors de quelques mouvements de Dégèuses de la part
de l'Animal. mettez le tourniquet dans le Patency
& opérez.

Terminez-vous de la Renette, rapprochez les
entaillures pratiquées ci-devant à la Parois,
& remettre jusqu'à ce que vous ayez atteint
les Parties molles. faites parcourir la
pointe du Bistouri courbe dans ces entaillures

à Inciser les feuilletts qui unissent cette même
Parois à l'os du pied. pratiquez avec le bistouri droit
une Incision au moyen de laquelle vous ouvrirez le
legument à la naissance de la Couronne, à compter
de la pointe du talon à la Mammelle. faites une
seconde Incision à ce même legument; mais dirigez-la
perpendiculairement à la précédente. tirez la de la partie
moyenne du bord supérieur du cartilage, & de manière qu'elle
forme avec cette même Incision pratiquée à la
Couronne deux angles opposés égaux. Saisissez chacune
ces angles l'un après l'autre avec les Pinces anatomiques,
disséquez-les avec le Scalpel jusqu'à ce que la
portion du cartilage hors de la Parois soit entièrement
à découvert. toute l'attention consiste ici à
diriger les coups de Scalpel le plus près du cartilage
qu'il est possible, à l'effet de laisser à ces portions
soulévées du legument plus d'épaisseur & par conséquent
plus de moyen de fournir à la Cicatrice. achevez ensuite
de découvrir la surface extérieure du cartilage. enlevez
pour cet effet la portion de la Parois qui a été retenue
& qui en recouvre le bord inférieur. promenez le Scalpel, faites-
le pénétrer du côté de la Couronne entre la face interne du
Sérot & la face externe du cartilage. Incisez tout les feuilletts
qui unissent ces parties; Saisissez le Parois du côté du
talon avec le Bistouri, soulevez-la & renversez-la
en penchant la main du côté de la Pince; disséquez



renverser toujours jusqu'à l'entièrement total de cette
portion des Os.

Le Cartilage découvert, procéder à son
extirpation: Soulevez le du côté du talon ou du côté de
la Pince, ou par le bord supérieur; disséquez-le en deux
au moyen d'un Scalpel à deux branches. Laissez-le
dès que vous le pourriez avec le bec de forbin ou avec
une Urbine. agissez toujours avec le Scalpel &
continuez d'une part à le soulever, & de l'autre à
disséquer, & ce jusqu'à son entière séparation.
De quelque côté que vous ayez saisi ce corps pour
l'extraire, il faut avoir soin de ne pas offenser le
tendon large & aplati des Muscles Extenseurs du
Pied, contre lequel l'extrémité antérieure du Cartilage se
termine. ayez encore la plus grande attention de ne pas
intéresser le Ligament Capsulaire de l'articulation
de l'os de la Couronne avec l'os du Pied: dirigez en conséquence
vos coups de Scalpel le plus près du Cartilage qu'il vous
sera possible. Il est d'autant plus facile d'ouvrir ce
Ligament qu'il adhère très-étroitement au corps Cartilagineux
dont il s'agit, qu'il est uni au parties qu'il recouvre d'une
manière assez lâche, & qu'il est lui-même très-fin.
Dès qu'il est lésé, le humeur Synoviale s'échappe.
Si une portion de la Capsule a été enlevée, l'accident
est plus grave que si elle était simplement incisée, il est
une autre manière d'opérer dans laquelle on risque
moins d'ouvrir cette Membrane. Entamez le Cartilage

Dans la partie moyenne, directement au droit de
l'articulation, au moyen d'une feuille de sonde à
lame étroite & très-affilée, enlever cette portion moyenne
d'un bord à l'autre par lamines minces & déliées, & ce
jusqu'à ce que vous ayez entièrement mis la Membrane
articulaire dont il s'agit à découvert. procédez ensuite
à la dissection & à l'extirpation des deux portions
restantes du cartilage, le tout conformément aux dimensions
que nous avons prescrites.

Il est bon d'observer qu'il reste toujours dans
l'une & l'autre des manières d'opérer quelques portions
du cartilage à l'endroit où ce corps adhère à l'os
du pied. enlevez-les très-exactement avec une gouge
ou avec la scie du Boutoir à opération. le premier
de ces Instruments doit être légèrement courbe sur
plat, & le Boutoir doit avoir une lame très-courte
à l'effet de pouvoir suivre le lambeau léger que l'on
observe dans la partie supérieure & latérale de l'os du
pied. Il est des parties cartilagineuses isolées qu'il faut
extraire & les enlever avec des ciseaux courbes
sur plat.

Le cartilage soigneusement enlevé, débrider le
Courniquet, délier le Membre, laissez sécher,
repreniez & refixez de nouveau le même Membre. placez
encore le Courniquet, & appliquez l'appareil
convenable. prenez garde de comprimer trop fortement
les lambeaux de peau que vous avez conservés: placez-les



entre des Plumaceaux Jambibes d'esprit de vin à l'effet de
maintenir toujours le ligament. Enveloppez le pied de
Larges Etoupades chargées de Substances grasses &
calmantes. mettez l'Enveloppe; Saignez le ^{l'animal} Malade
à la Jugulaire & placez-le dans la Courie sur une
bonne Litière, & qui n'a rien pas à manger de
quatre heures.

Si le Ligament Capsulaire est ouvert, placez
sur le lieu de la Lésion un Plumaceau chargé d'une
espèce de Pâte faite d'un Mélange de lauptrie &
~~de N° 1 & 2~~ ou bien mettez un Plumaceau
Jambibé de Surtout d'Elloës fortement chargé de
Poudre d'Elloës. vous aurez attention de laisser tomber
ces Substances Résineuses d'elles-mêmes & de ne
point les ôter lors des Premiers Pansements.